

Plivit[®] D3

holekalciferol

Naložba v zdravje.

Plivit[®] D3 (holekalciferol)

**Plivit[®] D3 4000 i.e./ml peroralne
kapljice, raztopina, 10 ml steklenica**

Terapevtske indikacije

- Preprečevanje rahitisa pri dojenčkih in malih otrocih zaradi neustrezne prehrane (pomanjkanje vitamina D, zmanjšana absorpcija).
- Dodajanje vitamina D, ko izpostavljanje sončni svetlobi ni možno (pozimi) in kot dodatek k prehrani pri nosečnicah in doječih materah s povečanimi potrebami.
- Preprečevanje osteoporozе.

Za več informacij o vlogi Vitamina D obiščite prenovljeno stran <https://www.tevasi.si/>

Skrajsan povzetek glavnih značilnosti zdravila

IME ZDRAVILA: Plivit D₃ 4000 i.e./ml peroralne kapljice, raztopina. **KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA:** 1 ml (20 kapljic) raztopine vsebuje 4000 i.e. holekalciferola. **TERAPEVTSKE INDIKACIJE:** Zdravilo Plivit D₃ se uporablja za: preprečevanje rahitisa pri otrocih, preprečevanje rahitisa pri nedonošenčkih, preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri otrocih z ugotovljenim tveganjem, preprečevanje pomanjkanja vitamina D pri otrocih z malabsorbcijo, preprečevanje pomanjkanja vitamina D, ko izpostavljanje sončni svetlobi ni možno (pozimi) in kot dodatek k prehrani pri nosečnicah in doječih materah s povečanimi potrebami, preprečevanje osteoporozе pri odraslih. **ODMERJANJE IN NAČIN UPORABE:** Odmernje Nosečnice in doječe matere: 2 kapljici (400 i.e.) dnevno. Za preprečevanje osteoporozе: 2-5 kapljic (400 i.e.-1000 i.e.) dnevno. Pediatrska populacija Otroci do 1. leta starosti: 2-5 kapljic (400 i.e.-1000 i.e.) dnevno, v skladu s priporočilom zdravnika. Otroci, starejši od enega leta: 2 kapljici (400 i.e.) dnevno. Odmerki, večji od 1000 i.e. dnevno, se pri otrocih, nosečnicah in doječih materah ne priporočajo. Ena kapljica vsebuje približno 200 i.e. holekalciferola. Način uporabe Kapljice je potrebno vzeti s čajno žličko soka ali mleka. **POVZETEK KONTRAINDIKACIJ:** Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju. Bolniki s hiperkalcemijo. **POVZETEK POSEBNIH OPOZORIL IN PREVIDNOSTNIH UKREPOV:** Dojenčki so lahko preobčutljivi za vitamin D₃, zato jim ga je potrebno odmerjati z veliko mero previdnosti. Zaradi večje možnosti pojavnosti hiperkalcemije ga je potrebno zelo previdno odmerjati tudi bolnikom z okvaro ledvic ali kamni v urinarnem traktu ter bolnikom z boleznimi srca in žilja. Pri teh bolnikih je potrebno spremljanje ravni kalcija v serumu. Možna smrtna zapleta hiperkalcemije sta srčna aritmija in ledvična odpoved. **POVZETEK MEDSEBOJNEGA DELOVANJA Z DRUGIMI ZDRAVILI IN DRUGE OBLIKE INTERAKCIJ:** Možnost hiperkalcemije se poveča ob hkratnem jemanju zdravila Plivit D₃ s pripravki, ki vsebujejo veliko kalcija, ali tiazidnimi diuretiki. Ob hkratnem jemanju zdravila Plivit D₃ in antacidov, ki vsebujejo magnezij, je možna hipermagnezija. Holestiramin, holestipol in neomicin zmanjšajo absorpcijo vitamina D₃ iz prebavil. Pri bolnikih, ki prejemajo digoksin in vitamin D₃, je potrebna previdnost, saj lahko hiperkalcemija (ki je lahko posledica uporabe vitamina D₃) povzroči srčne aritmije. **POVZETEK NEŽELENIH UČINKOV:** Priporočeni odmerki zdravila Plivit D₃ običajno nimajo neželenih učinkov. Presnovne in prehranske motnje: hiperkalcemija (hipervitaminoza) se lahko pojavi le ob prevelikem odmerjanju (ali nenadzorovani in dolgotrajni uporabi). **IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM:** Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k semjišču 35, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija. **DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA:** 09.11.2016

teva

Datum priprave informacije: november 2020. Samo za strokovno javnost. Način izdajanja zdravila: Samo na zdravniški recept. Za vse podrobnejše informacije se obrnite na zastopnika imetnika dovoljenja za promet Pliva Ljubljana, d.o.o., Pot k Semjišču 35, 1231 Ljubljana Črnuče, tel. 01 58 90 390, e-mail: info@tevasi.si
MULTI-SI-00008